

THÔNG BÁO
Về việc chủ động phòng chống sinh vật gây hại
trên lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026

Đến thời điểm hiện tại, sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025 – 2026 trên địa bàn xã An Phú đã xuống giống 2.567 ha, đạt 100,2% kế hoạch. Cơ cấu sinh trưởng cụ thể như sau:

- Lúa giai đoạn đẻ nhánh: 220 ha (chiếm 8,6%)
- Lúa giai đoạn làm đòng: 542 ha (chiếm 20,4%)
- Lúa giai đoạn trổ: 1.773 ha (chiếm 69%)
- Lúa giai đoạn chín: 50 ha (chiếm 2%)

Qua công tác thăm đồng, theo dõi tình hình sản xuất trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như rầy nâu, rầy phấn trắng, bệnh đạo ôn.... Các đối tượng này có khả năng phát triển và gây hại cục bộ, nhất là trên những ruộng sạ dày, bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý.

Trước tình hình trên và những diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm bảo vệ an toàn sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025 – 2026, Ủy ban nhân dân xã An Phú thông báo và khuyến cáo nông dân thực hiện một số biện pháp quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại như sau:

*** Biện pháp chung**

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng gây hại, đặc biệt chú ý bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy phấn trắng và sâu cuốn lá để xử lý kịp thời, tránh lây lan trên diện rộng.

- Khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc “**4 đúng**”: đúng thuốc – đúng lúc – đúng liều lượng – đúng cách; đảm bảo hiệu quả phòng trừ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế ô nhiễm môi trường.

*** Biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng**

1. Bệnh đạo ôn, lem lép hạt: Bệnh có khả năng gây hại nặng trên các giống OM 5451, Đài thơm 8, OM 18,... khuyến cáo bà con cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

2. Rầy nâu: Đối với lúa ở các giai đoạn đòng - trổ, cần thăm đồng và theo dõi mật số rầy thường xuyên.

- Nếu mật số thấp, gây hại không đáng kể, chưa đến ngưỡng phòng trừ thì tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

- Nếu mật số rầy nâu cao (*ngưỡng phòng trừ từ 3 con/tép trở lên*) cần tiến hành phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”.

Lưu ý: khi phun thuốc cần đảm bảo đủ lượng nước, phun kỹ và đều. Trường hợp ruộng chủ động nước, nên cho nước vào ruộng trước khi phun để đưa rầy lên phía trên thân lúa, giúp thuốc tiếp xúc tốt hơn và nâng cao hiệu quả phòng trừ.

3. Rầy phấn trắng: Có khả năng xuất hiện và gây hại cục bộ trên các trà lúa ở giai đoạn làm đòng đến trổ, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài.

Khi mật số đạt ngưỡng phòng trừ (15–20 con thành trùng/cây hoặc 5 ấu trùng/lá), nông dân có thể sử dụng thuốc có hoạt chất được khuyến cáo. Sau khi xử lý nên bón phân bổ sung hợp lý để giúp cây lúa phục hồi và phát triển tốt.

Ủy ban nhân dân xã An Phú đề nghị các đơn vị có liên quan, Ban nhân dân các ấp phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt nội dung thông báo này nhằm đảm bảo thắng lợi trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025 – 2026./.

Nơi nhận:

- VP. HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã;
- Hội Nông dân xã;
- Trạm KTTN khu vực An Phú;
- Ban nhân dân các ấp;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Hưng Thượng